

C.O.

TRATAMENTO
DA
FEBRE AMARELLA

SEGUNDO AS INDICAÇÕES DOS MAIS ACREDITADOS MEDICOS
HOMŒOPATHAS

SEGUNDO DOS

CONSELHOS HYGIENICOS

publicados no « Jornal do Commercio »
sob a assignatura do digno Presidente da Junta de Hygiene
Publica.

OFFERECIDO AO POVO

PELOS PROPRIETARIOS

DA

BOTICA CENTRAL HOMŒOPATHICA

59 Rua de S. José 59

CASA DA VIUVA MARTINS & C.

RIO DE JANEIRO

Typ. da America, rua da Assembléa n. 36-A.

1873.

RF

FEBRE AMARELLA.

A côr amarella da pelle, e o vomito de materias negras são os principaes symptomas. O primeiro se manifesta ordinariamente pelo 3.º ou 4.º dia, algumas vezes desde o 1.º ou 2.º ; mas em alguns casos esta coloração não tem lugar senão no momento da morte, ou depois della ; mostra-se successivamente na face, no peito e sobre o resto do corpo ; a côr amarella é ordinariamente bem pronunciada, mas tambem offerece um colorido de vermelho, de verde, de negro, ou de uma côr achumbada.

Os vomitos começam em geral com a doença ; as materias lançadas, são a principio viscosas e acidas, depois amarellas, verdes, e côr de ferrugem ; tornão-se sanguinolentas, escuras, e negras nos dias, ou momentos que precedem a morte.

Os symptomas geraes que acompanhão a coloração de amarello na pelle, são quasi os mesmos da febre putrida ; mas na febre amarella as hemorrhagias tem lugar, das fossas nasaes, da boca, do estomago, dos intestinos, da bexiga, das partes genitales, da conjunctiva, do conducto externo e do tecido cellular sub-cutaneo.

A febre amarella tem 3 periodos muito distinctos, quando se desenvolve completamente, que são :

1.º DE TRANSPIRAÇÃO.

2.º DE EXTRAVASACÃO.

3.º DE VOMITO PRETO.

Segundo o estado do enfermo, no

1.º periodo emprega-se ACONITUM, PULSATILLA OU BELLADONA.

2.º » » MERCURIUS, NUX-VOM. OU BRYONIA.

3.º » » ARSENICUM, CARB-VOM. OU VERATRUM,

Logo que o doente sente calafrios, dores de cabeça, nauseas, algumas vezes vomitos, deve mudar de roupa, recolher-se á cama, agasalhar-se com moderação e principiar a tomar os medicamentos, conforme os symptomas que apresentar a enfermidade.

1.º Periodo.

ACONITUM, 3.ª ou 5.ª dy. — Febre, dôr de cabeça, pouca ou nenhuma transpiração, nauseas e vomitos : 6 gottas em 8 colhe-

res d'agua, para tomar uma colher de hora em hora, ou de duas em duas horas.

PULSATILLA, 3.^a ou 5.^a dy. — Dores violentas nas cadeiras, dores pelo ventre, vomitos repetidos de mucosidades, suspensão de urinas e de evacuação: a mesma administração.

BELLADONA, 3.^a ou 5.^a dy. — Sofrimento da garganta, dores violentas no epigastro, inquietação e delirios: a mesma administração.

Na generalidade dos casos, a febre tem desaparecido, com algum destes medicamentos, no segundo dia da enfermidade.

2.º Periodo.

BRYONIA, 3.^a ou 5.^a dy. — Se houver dores pelo peito, difficuldade de respirar, pouca febre, alguma expectoração purulenta: 8 gottas em 10 colheres d'agua, uma colher de hora em hora, ou de duas em duas horas.

MERCURIUS SOLUBILIS, 3.^a ou 5.^a dy. — Se a transpiração tem desaparecido, e o doente estiver inquieto, com a pelle fresca e de côr amarella escura, pulso fraco, muita sede, insomnia, delirios, urinas em pequenas gottas e muito amarellas, apresentando os symptomas de ictericia: a mesma administração da **BRYONIA**.

NUX-VOMICA, 3.^a ou 5.^a dy. — Se houver algumas dores pelo ventre, muitas evacuações, urinas em grande quantidade, porém quentes e amarellas: administra-se do mesmo modo da **BRYONIA**.

Nestes casos ainda são applicaveis em 3.^a e 5.^a dynamisação **DULCAMARA** e **BRYONIA**, alternados de hora em hora, e preparados do mesmo modo.

3.º Periodo.

ARSENICUM, 5.^a dy. — Havendo vomitos repetidos de billis verde-escuro, ou de mucosidades com estrias pretas ou mesmo de vomito preto, semelhante a borra de vinho, pelle secca e amarella escura, pulso pequeno e muito frequente, lingua amarella escura com manchas pretas, muito secca e aspera como lixa, especialmente na ponta, dores no epigastro, soluços, vertigens, evacuações pretas com tenesmos, caimbras nas pernas, urinas em pequenas gottas, muito amarellas: 6 gottas em 8 colheres d'agua, uma colher de hora em hora, augmentando-se o intervallo das doses á proporção das melhoras.

CARBO VEGETABILIS, 3.^a ou 5.^a dy. — Havendo tosse e expectoração, muita debilidade, inapetencia, alguma febre, muita transpiração e em uma convalescença demorada: 6 gottas em 8

colheres d'agua, uma colher de duas em duas horas, ou de 4 em 4 horas, conforme a intensidade do mal.

VERATRUM ALB., 5^a dy. — Havendo febre, dores pelo ventre, gargarejo em todo o ventre, seccura, vomitos pretos, anciedade e delirios: a mesma administração que com os medicamentos anteriores.

Neste periodo ainda são applicaveis os seguintes medicamentos alternados:

Nos vomitos pretos.

PLUMERIA E VERATRUM, ARGENT. NITRIC. E CACTUS OP., LAURO CER. E ARSENIC., ARSENIC. E CARB. VEG.

Ainda nos casos mais graves e já desesperados: RHUS. e PHOSPH. AC., LACHES. e STRYCHININ.

Qualquer destes medicamentos preparam-se: 6 gottas em 8 colheres de agua, e tomão-se alternados, uma colher de chá de meia em meia hora.

Nas hemorrhagias.

O principal medicamento é TAPYCHIN-TAN. em 3.^a dyn., 8 gotas em 6 colheres de agua, uma colher de chá de quarto em quarto de hora.

Pela mesma fórma se applica o MELANUS, e na mesma dynam. e quantidade.

Em casos rebeldes, applicação-se alternados estes dois medicamentos, preparados da mesma fórma, sendo administrados de meia em meia hora.

Ainda são applicados alternados: ERGOT. e CHIN., ALUM. e BARYT. CARB. A administração é igual á que acima vai indicada.

Note-se:

Na applicação de qualquer destes medicamentos, e em qualquer dos casos, é necessario não haver precipitação, guardando sempre um espaço sufficiente para a acção do medicamento; mas tambem não convem que este espaço seja tal, que deixe a molestia progredir.

A dieta não deve passar de caldos de franga, e para bebida, agua pura ou com assucar.

Conselhos Hygienicos pela Junta de Hygiene Publica.

A junta central de hygiene publica, como é de seu dever, sempre que grassa uma epidemia, dirigido-se aos seus concidadãos indicando-lhes os meios provaveis de preservarem-se de seus ataques; e comquanto devão ainda estar na

memoria do publico esses conselhos, entende todavia a junta que, não sendo improficuas as repetições em taes emergencias, deve rememorar em poucas palavras as precauções que cada um individualmente póde tomar por occasião da actual epidemia de febre rmarella que vai se desenvolvendo, pondo de parte a exposição das grandes medidas de salvação publica, que são da competencia da administração superior, e que têm sido postas em pratica á requisição da junta central de hygie-n publica e da inspecção de saude do porto.

As cautelas, pois, que a junta julga dever especialmente indicar neste trabalho são as seguintes:

1.^a Conservar no maior asseio possivel as habitações e suas dependencias, taes como áreas, quintaes, lojas, cocheiras, etc., fazendo-as varrer todos os dias, expondo-as constantemente á ventilação durante o tempo secco, ou em que não reinem os ventos sul e sudoeste acompanhados de chuvas copiosas.

2.^a Lavar as casas uma ou duas vezes por semana com agua simples ou com sabão, e com agua chloruretada se a epidemia fôr ganhando intensidade.

Naquellas em que se der algum caso de molestia reinante convém recorrer-se logo ás aspersões com chloro ou com agua de Labarraque, e, melhor ainda ás fumigações de enxofre ou salitre.

3.^a Remover do interior das habitações ou de suas dependencias tudo quanto possa contribuir directa ou indirectamente para a corrupção e viciação do ar atmospherico, e evitar o mais possivel a accumulção de aves, de animaes domesticos, de materias estercoraes, de aguas servidas, e finalmente de todos os residuos vegetaes ou animaes.

4.^a Cair de vez em quando as paredes do interior das casas e dos quintaes, principalmente quando estas forem humidas, ou estiverem pouco assejadas e impregnadas de substancias nocivas á saude.

5.^a Evitar agglomeração de muitas pessoas em pequeno espaço para dormirem, de sorte que os donos das fabricas, armazens e outros estabelecimentos, que demandão maior ou menor concurso de individuos, deverão sobretudo velar especialmente pela saude de seus empregados, famulos ou escravos, não os obrigando a trabalhos excessivos, e proporcionando-lhes dormitorios ou aposentos vastos, bem arejados, seccos e sufficientemente assejados, e não proximos a algum deposito de immundicies.

6.^a Empregar fumigações repetidas com enxofre nos quartos, ou outros logares em que tenha succumbido algum doente, fazer caial-os, e abandonal-os depois por dous ou mais dias á ventilação e arejamento.

7.^a Dormir, sendo possível, nos aposentos da casa mais espacuosos, e em que penetre maior somma de luz e de ar durante o dia, e remover delles as roupas sujas que tenham servido durante o trabalho ou quaesquer outras.

8.^a Passeiar ao ar livre e puro pela manhã, ou á tardinha, procurando-se de preferencia os logares elevados, sem comtudo levar-se o exercicio ao ponto de fatigar, porque então poderá tornar-se prejudicial.

9.^a Resguardar o corpo da humidade e das variações atmosphéricas, usando-se roupas apropriadas ao tempo; ter cuidado de mudal-as logo que se chegue suado á casa, afim de evitar a suppressão rapida da transpiração, que póde constituir-se uma causa occasional da molestia; e ordenar que sejam estendidas fóra dos aposentos de descanso, e em lugar bem arejado, as roupas suadas, maxime as de lã ou seda, as quaes mais facilmente se deixão impregnar dos miasmas infectuosos.

10. Usar de banhos geraes simples ou alcalinos que entretenham a limpeza da pelle, podendo elles ser mornos ou frios, segundo o habito de cada um, mas com moderação e com as devidas cautelas para não dar lugar ás impressões subitas de variada temperatura, e nunca achando-se o estomago em estado de plenitude.

11. Usar de uma alimentação substancial e de facil digestão, assim como um pouco de vinho generoso (havendo o habito de bebê-lo) na ocasião da refeição; evitar cuidadosamente as substancias indigestas, as fructas mal sazoadas (principalmente acidas), os legumes, as carnes e peixes salgados, etc., e emfim os excessos da gula e o abuso de bebidas espirituosas ou geladas, pois que a observação tem demonstrado que a bebedice e a glotoneria concorrem para a mortandade nas epidemias com um contingente proporcional ao da miseria das classes a que fallecem os meios de asseio, de uma alimentação saudavel e abundante, e emfim todas as commodidades da existencia.

12. Fugir de todas as causas que possam excitar paixões vivas ou deprimentes, desterrar do espirito o temor exagerado da epidemia, e não empregar contra esta eacesso nas precauções, porque tudo isto póde ser tão prejudicial quanto a coragem; a confiança e a tranquillidade são disposições favoraveis para arredar ou attenuar o impeto da epidemia.

13. Se nas circunstancias ordinarias da vida o somno é indispensavel para a reparação das forças entibiadas pelos trabalhos diários, e para conservação do perfeito equilibrio das funcções da economia, torna-se evidente a necessidade, quando reina uma epidemia mortifera, de deitar-se a horas convenientes não frequentando assiduamente os theatros, os bailes e outras quaesquer reuniões que se estendam até alta noite, porque além da fadiga que causão os divertimentos prolongados, e dos excessos a que elles dão lugar algumas vezes, occorre o grave inconveniente de se exporem seus frequentadores á acção nociva do sereno, e de respirarem durante muitas horas um ar viciado não só pela agglomeração de numerosa quantidade de pessoas, como pela combustão das materias empregadas para a illuminação das salas.

14. Aos primeiros signaes de qualquer indisposição, cumpre fazer logo applicação dos meios therapeuticos convenientes, para que não succedão males maiores, e talvez irremediaveis ; e por isso os chefes de familia, e aquelles que tiverem sob sua dependencia muitas pessoas, deverão todos os dias pela manhã, ter o cuidado de indagar minuciosamente do estado de saude de seus subordinados, providenciando incontinenti, conforme as circumstancias o exigirem.

15. O uso de purgantes, e de outros meios não aconselhados pela medicina, mas imbuidos pela especulação no animo do povo ; uma excessiva abstinencia, e a mudança subita de habitos inveterados com que não tenha soffrido detrimento a saude de quem os tenha, e tudo isto no intuito de prevenir a molestia, são prejudiciaes, e podem antes contribuir para o effeito opposto áquelle que se deseja alcançar.

16. Finalmente, naquellas casas em que já estiver funcionando o actual systema de esgoto, devem-se manter sempre no maior asseio as latrinas e bacias de aguas servidas ; não esquecendo a condição essencial de conserva-las constantemente com certa quantidade de agua limpa, para que não tenha lugar o desprendimento de gases fetidos, como tão commummente succede por falta dessa cautelas ; naquella, porém, em que tal systema não estiver ainda em pratica, as vasilhas que servem de receptaculo das materias excrementicias deverão ser conservadas hermeticamente fechadas, convenientemente limpas e collocadas fóra das habitações, ou pelo menos longe dos dormitorios, e desinfectas pelos meios já conhecidos, sempre que for isso possivel.

La fiebre amarilla y la ciudad convalescente—En el *Jornal de Comercio* de Río Janeiro y en su número del 8 de Abril, encontramos un juicioso artículo de un distinguido médico brasileiro, que publicamos á continuacion:

«Una epidemia mortífera, como es la fiebre amarilla, pierde su fuerza destructora y deja de producir horror cuando es conocida y son conocidos los medios de cortarla; este fué y es todo nuestro empeño. Hoy que la fiebre amarilla ha casi desaparecido de esta ciudad y que una décima parte de esta poblacion se halla en una buena y segura convalescencia, es necesario afirmar bien nuestras ideas sobre este mal que tanto ha flajelado nuestras ciudades.

«La esperiencia ha demostrado que la fiebre amarilla desaparece á los 25° centígrados de calor atmosférico y que se desarrolla á los 27° centígrados para arriba.

«Este mal epidémico presenta tres formas muy distintas, forma ictheroide, por el deramamiento general de bílis; forma emorrágica con el vómito negro; forma perniciosa, ataca los órganos abdominales, ó neumo-gástricos.

«La forma hemorrágica con el vómito negro es el tipo mas conocido por los médicos brasileiros.

«Para combatir y curar la fiebre amarilla, luego que se manifiesta con los síntomas, vahidos y dolores de cabeza, vómitos biliosos y fiebre basta el *Acónito*, en el segundo día la *Bellacona*, en la generalidad de los casos, el doliente queda curado; si pasa el segundo período, tomará el *Arsénico*; si continúan los vómitos, el *Mercurio*; de *H*, si el hígado es mas atacado.

«Es en el tercer período cuando los síntomas se presentan gravísimos, y por mucho tiempo considerados mortales. El tífus ictheroide cede y se cura con el *Phosac*, el *Arsénico* y el *Ch-ox-s*; las hemorrájas y el vómito negro se curan con la *Ergotina*, la forma perniciosa se cura con el *Ch-ox-s* y el *Phosac*.

«La *Plumeria* es un medicamento precioso para combatir en muchos casos las hemorrájas por la nariz y por la boca.

«El tratamiento pronto y seguro seguido por todos los médicos homeópatas, libró aún en 1873 esta gran ciudad de Río Janeiro de los horrores sufridos en Buenos Aires, que, con una poblacion menor, perdió mas de 30 mil individuos durante la epidemia de la fiebre amarilla.

«Aquí todos tomaron el *Acónito*, todos se curaron á tiempo; allí todo fué confusion, horrores y mortandad; démos, pues, gracias á Dios.

Recomiendo á todos que guarden la receta, como una leyenda de fantasía, para la generacion de lo futuro para

DARTRINE

Medicamento Homœopatico

NOVAMENTE DESCOBERTO

Dartrine: medicamento recentemente descoberto, para a cura radical, e completa de enfermidades da pelle, dartros, manchas, pannos e boubas, sendo o primeiro depurativo.

USO INTERNO

6 gottas de tintura mõi em seis colheres de sôpa, de agua, para tomar-se duas colheres de manhã e duas ao deitar-se.

Ponha-se um pouco de tintura mõi em um vaso apropriado e com um pincel unte-se os dartros cinco ou seis vezes ao dia.

Tem a propriedade este medicamento, de combater o mal no ponto em que se acha localizado: sem receio de atacar qualquer órgão interno.

DARTLINE

Medicamento Homoeopático

DEPOSITO DE GOVERNO

Indicações: medicação indicada para a cura
radical e completa de todas as doenças agudas,
crônicas e hereditárias, sendo o principal de todas.

Preço: 1000000

É muito de notar que este collyrio de
parceira se trata de uma collyrio de
Fórmula de um ponto de vista com uma
e com um ponto de vista de outras coisas
Tem a propriedade de medicação, de collyrio e
ponto em que se acha a fórmula, sem ter a
qualquer intenção.

